



## PRUNING CALENDAR FOR OAK WILT PREVENTION

Oak Wilt, one of the most destructive tree diseases in the United States, is killing oak trees in Central Texas at epidemic proportions. Proper pruning techniques and timing can help prevent oak wilt. Oak wilt is expensive to manage, affects aesthetics, and decreases property value. Prevention is key.

### FEBRUARY



Beetles that carry the fungus spores from tree to tree are **most active February-June**.

Avoid pruning/wounding oaks February-June if possible. If pruning is a necessity for safety purposes, make sure to **PAINT ALL OAK WOUNDS IMMEDIATELY**.

### MAY

Oak trees typically show symptoms of oak wilt at this time of year. Reach out to a tree professional if concerned.



### JULY

Beetles and fungal mat activity decrease with high temperatures.

### AUGUST

Pruning your oak trees in the heat of summer can stress the tree. Try to wait until fall/winter to tackle pruning unless safety is a concern.

### OCTOBER

Now is a good time to prune your trees, but always paint oak wounds immediately!

### NOVEMBER

Fall is a great time to plant new trees!

### DECEMBER

Don't move firewood! Never use infected red oak wood.

### JANUARY

Wrap up your tree pruning.



Community Announcements



## CALENDARIO DE PODA PARA PREVENCIÓN DEL MARCHITAMIENTO DEL ROBLE

Marchitamiento del roble, una de las enfermedades arbóreas más destructivas en los Estados Unidos, está matando los robles en el centro de Texas en proporciones epidémicas. Las técnicas de poda y el tiempo adecuado pueden ayudar a prevenir el marchitamiento del roble. El marchitamiento del roble es costoso de manejar, afecta la estética y disminuye el valor de la propiedad. La prevención es clave.

### FEBRERO



Los escarabajos que transportan las esporas de hongos de árbol a árbol son **más activos entre febrero-junio**.

Evite podar/herir robles entre febrero-junio. Si la poda es necesaria por motivos de seguridad, asegúrese de **pintar todas las heridas de roble inmediatamente en cualquier momento del año**.

### MAYO

Los robles suelen mostrar síntomas de marchitez de roble en esta época del año. Comuníquese con un arborista profesional si está preocupado.



### JULIO

La actividad de los escarabajos y el manto fúngico disminuye con las altas temperaturas.

### AGOSTO

La poda de sus robles en el calor del verano puede estresar el árbol. Trate de esperar hasta el otoño/invierno para hacer frente a la poda a menos que la seguridad sea una preocupación.

### OCTUBRE

¡Ahora es un buen momento para podar sus árboles, pero siempre pinte las heridas en el roble inmediatamente!

### NOVIEMBRE

¡El otoño es un buen momento para plantar nuevos árboles!

### DICIEMBRE

¡No transporte leña! Nunca utilice madera de roble rojo infectada.

### ENERO

Concluya la poda de su árbol.



Anuncios de la comunidad



TEXAS A&M  
FOREST SERVICE

Visite [texasoakwilt.org](http://texasoakwilt.org) para más información.